

LES ROSES.

Divisions du limbe, presque toujours entières, rarement munies de quelques pinnules très-fines, cotonneuses à l'intérieur, glanduleuses extérieurement, plus longues que la corolle. Étamines très-nombreuses. Stygmates réunis en une tête sessile au centre de la fleur. Fruit ellipsoïde.

Enumération des variétés de ce Rosier.

R. REDUTEA.

R. *germinibus ovato-globosis, glabris hispides; pedunculis glanduloso-hirsutis; foliis ellipticis, utrinque glabris, simpliciter serratis; petiolis subaculeatis; aculeis caulinis inæqualibus subrectis, numerosissimis; floribus geminatis ternatis; laciniis calycinis corollam inapertam superantibus; fructibus subglobosis*. THY. R. REDUTEA, etc., p. 3. Annales Enc. de MILLIN, janv. 1818, p. 35.

α. R. *Redutea glauca, foliis glaucis acutis subdiscoloribus; floribus albis, apice rubello punctatis*. THY. l. c.

R. (*Spinosissima*) *nova variegata*. Du P. Choix des Roses, p. 3.

Rosier très-épineux à fleurs vergetées de rose, et à feuilles glauques. Le même, cat. inédit, série 4^e, n° 11. Vulg. *la Pimprenelle à feuilles glauques*. *La Redouté à feuilles glauques*. Cette variété a le port du R. *Rubrifolia*.

β. R. *Redutea parvifolia, aculeis caulinis subrectis inæqualibus (majores foliorum longitudine); foliis subrotundis, floribus albidis*. THY. l. c. p. 5, var. β. Annales Enc., l. c. p. 37, var. B. *La Redouté à petites feuilles*.

Rameaux allongés, flexibles, couverts d'aiguillons jaunâtres, serrés et d'inégale longueur. Folioles petites et presque rondes. Pétioles, pédoncules et tubes des calices glabres. Fleurs blanchâtres geminées ou ternées.

Cette variété a quelque rapport avec le *Myricantha* de M. DE CANDOLLE; mais celui-ci en diffère par ses pédoncules uniflores, ses folioles doublement dentées, et par ses aiguillons beaucoup plus longs.

γ. R. *Redutea Rubescens, germinibus globosis, pedunculis laciniisque hirsutis; foliis lucidis glabris subdiscoloribus; petiolis subaculeatis; caule aculeis numerosissimis, sparsis, inæqualibus, subrectis, purpureis; floribus rubris*. THY. l. c., p. 5, var. γ. Ann. Enc. l. c. var. C.

R. (*Parviflora*). Du P. cat. inédit, série 16. NOUV. DUHAM. t. 7, p. 18, excl. var. α. R. (*Blanda*). ANDR. R. fig. Vulg. *la Redouté à tiges et à épines rouges*.

Ces trois arbustes avaient été jusqu'aujourd'hui confondus avec le Rosier à feuilles de Pimprenelle; mais ils en diffèrent :

1^o Par leurs aiguillons qui persistent sur les tiges adultes : le Rosier Pimprenelle les perd en vieillissant;

2^o Par leurs pédoncules multiflores : les pédoncules sont toujours uniflores dans le Rosier à feuilles de Pimprenelle;

3^o Par leurs divisions calicinales plus longues que la corolle avant son épanouissement : ces mêmes divisions sont toujours plus courtes dans le Rosier Pimprenelle.

On doit considérer le *Rosa Redutea* comme un hybride du R. *Pimpinellifolia* et du R. *Rubrifolia*, doué comme ces deux plantes de la faculté de se féconder et devenu, ainsi, le type d'un Rosier nouveau qui a été dédié au peintre de cet ouvrage.